

Tijdelijk stoppen met het gebruik van acenocoumarol voor de operatie



Binnenkort wordt u geopereerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat u drie dagen voor de operatie stopt met het innemen van de acenocoumarol. In deze folder geven wij u hier meer informatie over.

De anesthesioloog, physician assistant of POS verpleegkundige heeft het tijdelijk stoppen met het gebruik van acenocoumarol met u besproken. De operatiedatum en de datum waarop u stopt met de acenocoumarol vindt u in de opname brief.

Voor de operatie

Voor de periode zonder acenocoumarol heeft u een recept voor injecties Fragmin (dalteparine) gekregen. Deze injecties nemen de werking van de acenocoumarol tijdelijk over. De injecties spuit u op de dagen zoals aangegeven in het schema. Indien de trombosedienst u anders adviseert, dan volgt u dat advies. Mocht de operatiedag wijzigen dan kunt u de data in het schema aanpassen.

		3 dagen voor de operatie	2 dagen voor de operatie	1 dag voor de operatie	de operatie dag
Datum					
Acenocoumarol		Stop	Stop	Stop	Stop
INR controle					INR
Fragmin	ochtend	-	1 injectie	1 injectie	-
	avond	-	1 injectie	-	-

Na de operatie

Uw behandelend specialist geeft na de operatie aan wanneer u de acenocoumarol weer kunt innemen. Voordat u weer goed ingesteld bent op uw eigen bloedverdunner kan het nodig zijn dat u nog een aantal dagen Fragmin (dalteparine) injecties moet gebruiken. Een nieuw recept hiervoor krijgt u van uw specialist.

Contact met trombosedienst

U dient de trombosedienst op de hoogte te brengen van uw geplande operatie, het feit dat u dient te stoppen met uw bloedverdunner en als de operatie dag wijzigt. Zij laten u weten wanneer u de INR moet laten controleren en geven u advies.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van deze folder? Neem dan gerust contact op met de preoperatieve screening van OCON via telefoonnummer **088 -708 5225**.

OCON Hengelo
Geerdinksweg 141
7555 DL Hengelo

OCON Almelo
Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo

Postadres
Postbus 546
7550 AM Hengelo

Website
www.ocon.nl